

Preparo do exame

ACETILCOLINA ANTICORPO MODULADOR DO RECEPTOR

OUTROS NOMES:

Acetilcolina, Anticorpo Modulador do Receptor

INTERPRETAÇÃO

Anticorpos contra o receptor da acetilcolina são encontrados em até 85% dos pacientes com Miastenia Gravis generalizada e 50% daqueles com Miastenia Gravis ocular. Embora altamente específicos para Miastenia Gravis, podem ocorrer em baixos títulos em pacientes com artrite reumatoide, timoma, cirrose biliar primária e em indivíduos tomando D-penicilamina. Em geral, os pacientes com Miastenia Gravis desenvolvem resposta policlonal contra componentes do receptor da acetilcolina. Além da ligação ao receptor, alguns desses anticorpos podem ter propriedade de bloquear a ligação da acetilcolina e outros podem modular a expressão do receptor na superfície da célula. Anticorpos moduladores promovem o cross-linking e internalização do receptor, que se torna menos disponível na superfície. A sensibilidade dos anticorpos ligadores e moduladores é semelhante, mas a solicitação de ambos promove um ganho de 5% na sensibilidade.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.