

Preparo do exame

ÁCIDO HOMOGENTÍSICO

OUTROS NOMES:

ÁCIDO HOMOGENTÍSICO – Pesquisa

INTERPRETAÇÃO

O ácido homogentísico acumula-se no sangue, urina e outros tecidos conjuntivos na alcaptonúria, doença que ocorre por deficiência da enzima ácido homogentísico-oxidase. Indicação: O teste é útil no diagnóstico da alcaptonúria. Interpretação clínica: Está aumentado na alcaptonúria Interferentes: aumentando - ácido aminosalicílico, levodopa, fenotiazinas, salicilatos, ácido ascórbico, L-dopa.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Urina isolada

-Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã ou qualquer outra micção com intervalo de no mínimo 2 horas sem urinar;

- Não é recomendado realizar no período menstrual. Em casos excepcionais e nos de urgência, pode ser realizada a coleta de urina no período menstrual utilizando um tampão vaginal;

- Lave as mãos. Realizar a antissepsia da região genital com água e sabão;

- Abra a embalagem, despreze o 1º jato da urina no vaso sanitário e colete o 2º jato da urina no pote estéril;

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.