

## Preparo do exame

### AGLUTININAS – ANTI RH soro

#### OUTROS NOMES:

AGLUTININAS IRREGULARES  
AGLUTININAS ANTI-RH, QUANTITATIVO  
ANTICORPOS ATÍPICOS  
ANTICORPOS HETERÓLOGOS  
ANTICORPOS INCOMPLETOS  
ANTICORPOS ISOIMUNES  
COOMBS INDIRETO (CI) QUANTITATIVO  
D, ANTICORPOS ANTI  
ERITROCITÁRIOS, ANTICORPOS ANTI  
IAT (INDIRECT ANTIGLOBULIN TEST)  
INCOMPATIBILIDADE DE RH, TESTE DE  
TESTE DE ANTIGLOBULINA INDIRETO (ERITRÓCITOS)

#### INTERPRETAÇÃO

É chamado de Coombs Indireto ou de Pesquisa de Anticorpos Irregulares a pesquisa de anticorpos direcionados a antígenos eritrocitários após imunização do indivíduo sob estudo. O teste consiste na pesquisa e identificação de anticorpos irregulares no soro, por meio da utilização de painéis de hemácias contendo os antígenos mais imunogênicos pertencentes aos principais sistemas de grupos sanguíneos. O teste está indicado para pacientes previamente transfundidos, para todas as gestantes no pré-natal e após a realização da imunoprofilaxia RhD. Caso o teste seja negativo no primeiro trimestre, o mesmo deve ser repetido no terceiro trimestre, preferencialmente na 28ª semana de gestação. Caso o mesmo seja positivo, deve ser repetido mensalmente até a 32ª semana e a cada 15 dias a partir da 33ª de gestação até o momento do parto. Nas situações em que seja detectado um anticorpo de importância clínica, pelo método gel-teste em meio de baixa força iônica/antiglobulina e/ou hemaglutinação convencional, a titulação do mesmo é automaticamente realizada. Gestantes que tenham anticorpos anteriormente identificados têm sua amostra prévia testada, em paralelo, sempre que a mesma esteja disponível, com a atual para se confirmar aumento de título do anticorpo.

O acompanhamento imuno-hematológico de uma gestante aloimunizada tem por finalidade indicar ao obstetra o momento ideal para realizar exames especializados. A imunização a antígenos de grupos sanguíneos menores pode ocorrer em decorrência de abortamentos, estações, infusão de material biológico, infusão de linfócito paterno ou transfusões prévias. Pacientes que receberam profilaxia com imunoglobulina anti-D podem apresentar positividade do teste alguns meses após a medicação.

## INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 4:00 horas.

No caso de paciente do sexo feminino, é imprescindível anotar a data da última menstruação.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

## HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas.

## IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.