

## Preparo do exame

### ALDOSTERONA EM PÉ

### OUTROS NOMES

TESTE POSTURAL  
ORTOSTÁTISMO

### INTERPRETAÇÃO

A aldosterona é secretada pela glândula adrenal. A sua produção é regulada pelo sistema renina-angiotensina. Elevações ocorrem no hiperaldosteronismo primário e secundário, dieta pobre em sódio, gravidez e Síndrome de Bartter. Reduções são observadas em alguns casos de hiperplasia adrenal congênita, deficiência de síntese, dieta rica em sódio, Doença de Addison e no hiperaldosteronismo hiporreninêmico. O principal uso clínico da dosagem de aldosterona (sérica e urinária) é o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. O sistema renina-angiotensina responde rapidamente a vários estímulos fisiológicos, tornando uma medida randômica de aldosterona, isolada, de pouco valor diagnóstico.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.  
Jejum de 4 horas.  
Paciente ficará no laboratório no mínimo 2:30 horas.  
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

### HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).  
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.