

Preparo do exame

ALFA 1 ANTITRIPSINA

OUTROS NOMES:

ENTEROPATIA COM PERDA PROTEICA
FEZES, PROTEINAS (PERDA PROTEICA)
PROTEINAS NAS FEZES, PERDA

INTERPRETAÇÃO

A alfa 1 antitripsina fecal é utilizada como marcador de perda proteica pelo tubo digestivo, por ser uma proteína resistente à degradação pelas enzimas digestivas. Valores aumentados são encontrados nas enteropatias perdedoras de proteína, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, intolerância ao leite de vaca, carcinoma gástrico, linfomas do tubo digestivo, Doença de Whipple, gastroenteropatia alérgica, linfagectasia intestinal, hipogamaglobulinemia congênita e Síndrome de Menetrier.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Fezes

Usar laxativos somente com orientação médica, evitar o uso de antiácidos e de contraste oral no mínimo 72 horas antes da coleta das fezes ou conforme orientação médica.

Necessário o envio de fezes frescas no coletor estéril, de modo que complete aproximadamente ½ (meio) frasco. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.