

## Preparo do exame

### AMILASE VÁRIOS MATERIAIS

A amilase em líquido de cisto pancreático pode ser utilizada na exclusão de pseudocistos de pâncreas. O American College of Gastroenterology sugere que valores de amilase <250 U/L excluem pseudocistos, com sensibilidade de 94% e especificidade de 42%. A análise do líquido de punção de cisto pancreático é muitas vezes realizada em conjunto com outros marcadores tumorais, CEA e CA19-9, no diagnóstico diferencial dos cistos pancreáticos.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Líquido de punção de cistos e coleções de qualquer localização, líquido de cisto pancreático.

Não realizamos a coleta do material, pois se trata de um procedimento médico.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.