

Preparo de exames

ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DA FOSFOLIPASE A2

OUTROS NOMES:

ANTI-PLA2R
ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DA FOSFOLIPASE A2
ANTICORPOS PARA GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA IDIOPÁTICA
ANTICORPOS PARA GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA PRIMÁRIA

INTERPRETAÇÃO

Autoanticorpos da classe IgG contra o receptor da fosfolipase A2 (PLA-2R) são considerados específicos para o diagnóstico de glomerulonefrite membranosa (GM) primária e podem ser detectados em 70-75% dos pacientes. O monitoramento da doença pode ser realizado pelos níveis séricos de anti-PLA-2R. A mudança no status da GM geralmente é precedida pelo aumento ou diminuição desses níveis séricos e até pelo seu desaparecimento. Assim, a determinação semi-quantitativa do anti-PLA-2R tem alto valor preditivo para remissão e recaída da doença.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.
Jejum de 4 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.