

Preparo do exame

ANTICORPOS IGG ANTI COXSACKIE A

A sorologia tem papel limitado no diagnóstico das infecções por vírus coxsackie, sendo útil quando duas amostras do soro do paciente são testadas. O vírus 9 do grupo A (A9) tem um antígeno comum com todos do grupo B o que propicia que sejam vistas reações cruzadas nas sorologias. Indicação: A sorologia pode ajudar a determinar o agente etiológico principalmente nas apresentações graves. Interpretação clínica: Aumento superior a 4 vezes dos títulos de anticorpos é indicativa de infecção recente.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clcando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.