

## Preparo do exame

### ANTICORPOS IGG ANTI COXSACKIE B

#### OUTROS NOMES:

Sorologia para Cossackie B

#### INTERPRETAÇÃO

Apesar do diagnóstico da infecção ser predominantemente clínica, os anti coxsackie vírus podem ser úteis em casos duvidosos com manifestação clínica de doença febril aguda sem diagnóstico. São o grupo de vírus coxsackie mais associados a miocardites virais agudas, cada vírus do grupo B possui um antígeno tipo-específico. No entanto, todos do grupo B e um do grupo A (A9) têm um antígeno comum. Indicação: A sorologia pode ajudar a determinar o agente etiológico principalmente nas apresentações graves. Interpretação clínica: Títulos positivos podem ser indicativos de infecção recente ou de uma infecção passada ou recente, uma vez que os níveis de anticorpos Coxsackie B persistem por poucos meses. Aumento de quatro vezes ou mais no título destes anticorpos no paciente com doença aguda também é típico do diagnóstico. OBS: Pode haver reatividade cruzada entre enterovírus, mas títulos elevados são geralmente associados com o sorotipo infectante.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.