

Preparo do exame

ASPERGILLUS ANTICORPOS

OUTROS NOMES:

ASPERGILINA, AC ANTI, PESQ
ASPERGILOSE FUMIGATUS
ASPERGILOSE, IGG
FUNGOS, SOROLOGIA P/ASPERGILLUS

INTERPRETAÇÃO

A sorologia é utilizada como método auxiliar no diagnóstico da aspergilose invasiva. Entretanto, um resultado negativo não exclui a doença. Pacientes imunocomprometidos, em uso de corticóides e antibióticos, tendem a ter títulos mais baixos ou indetectáveis. Podem ocorrer reações cruzadas com histoplasmose, blastomicose e paracoccidioidomicose. Indicação: diagnóstico da aspergilose. Interpretação clínica: A sorologia é positiva em 90% dos pacientes com aspergilomas e 70% dos casos de aspergilose broncopulmonar alérgica. Para o diagnóstico, qualquer título é significativo e uma ascensão de 4 vezes ou mais do título entre duas amostras pareadas colhidas com intervalo de 2 semanas é confirmatória da infecção recente.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.