

Preparo do exame

BORRELIA IgM

OUTROS NOMES:

DOENÇA DE LYME
BORRELIOSE

INTERPRETAÇÃO

Exame útil no diagnóstico de infecção causado pela espiroqueta *Borrelia burgdorferi*, transmitida pelo carrapato, e leva à doença Lyme.

A pesquisa de anticorpos anti-borrelia auxilia no diagnóstico de doença de Lyme, no entanto pode ocorrer reação cruzada com outras espiroquetas, como por exemplo, sífilis e leptospirose. Pacientes nos estágios iniciais, assim como os precocemente tratados, podem não apresentar níveis detectáveis de anticorpos. Neste caso é recomendável que os pacientes com história clínica e/ou sintomas sugestivos da doença sejam reanalisados em nova amostra após quatro a seis semanas. Na interpretação dos resultados da sorologia é também necessário levar em consideração a soroprevalência em uma determinada região. Na população com baixa prevalência da doença, o exame tem valor preditivo positivo baixo, isto é, a probabilidade de doença verdadeira é menor. O Centro de Controle de Doenças na América do Norte recomenda que os resultados extremos e positivos sejam confirmados por um teste de Western Blot.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4:00 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.