

Preparo de exames

Cintilografia da Tireóide

Este exame serve para avaliar a função tireoidiana, bem como o funcionamento de nódulos. Também é indicado para pesquisa de glândula ectópica e remanescente pós-operatório.

O procedimento engloba duas fases distintas:

- na primeira (D1), o cliente comparece ao Centro Médico em jejum de 4 horas. O radiotraçador administrado é o IODO 131, em quantidade mínima, por via oral. É realizada captura de imagens após duas horas;

- na segunda fase o paciente retorna no dia seguinte (D2) para nova captura de imagens. Logo após, é realizada administração endovenosa de OUTRO radiotraçador (Tecnécio 99) e as imagens são adquiridas em um intervalo de 20 minutos, tendo duração variável, não ultrapassando 60 minutos.

PREPARO

Suspender medicação: TAPAZOL, PROPILTIOURACIL e/OU METIMAZOL durante 5 dias que antecedem o exame, conforme indicação médica.

Demais orientações serão fornecidas pela equipe de Medicina Nuclear, após o agendamento.

Jejum de 4 horas no dia do exame da primeira fase (D1).

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.