

Preparo do exame

CISTICERCOSE IGG

OUTROS NOMES:

SOROLOGIA PARA CISTICERCOSE

INTERPRETAÇÃO

Exame utilizado na complementação diagnóstica de cisticercose. O homem é o hospedeiro definitivo da *Taenia solium* e também pode ser hospedeiro intermediário pela ingestão de água ou verduras foliáceas contaminadas, por ovos ou proglotes, desenvolvendo a forma mais grave, que é a cisticercose. Indicação: A pesquisa de anticorpos no soro e liquor pode ser utilizada de forma complementar ao diagnóstico por neuroimagem. Interpretação clínica: São comuns as reações cruzadas com *Echinococcus granulosus* e *Hymenolepis nana*. Os anticorpos podem persistir anos após a morte dos parasitas, não devendo, o encontro de sorologia positiva em pacientes com lesões calcificadas, ser interpretado como presença de parasitas vivos. Falso-negativos podem ser observados na presença de carga parasitaria baixa, sendo que apenas 28% dos pacientes com lesão cerebral única têm sorologia positiva.

INSTRUÇÕES DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.