

## Preparo do exame

### CITOMEGALOVIRUS AVIDEZ IGG

#### INTERPRETAÇÃO

A medida da avidéz baseia-se no grau de maturação dos anticorpos IgG no decurso da resposta humoral. Quanto mais avançado o grau de maturação tanto mais elevada é a proporção de anticorpos altamente ávidos. Avidéz baixa da IgG é indicativa de infecção primária ao passo que avidéz elevada é sugestiva de infecção pregressa. Sinônimos: Avidéz para citomegalovírus; CMV com avidéz; IgG com avidéz para Citomegalovírus. Indicações: Diferenciação diagnóstica de infecção recente e passada por CMV. Interpretação clínica: O teste de avidéz de anticorpos permite estimar o período aproximado em que ocorreu a primo-infecção. Percentagem de avidéz inferior a 30% sugere que a infecção é aguda e tenha ocorrido há menos de dois meses. Na reinfeção e reativação o teste não se aplica, pois, os anticorpos IgG podem apresentar diferentes afinidades. Percentagens maiores que 30% não permitem identificar o provável período em que a infecção ocorreu.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

Não realizado em crianças menores de 2 anos.

Não realizado em pacientes recém-transplantados.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.