

Preparo do exame

CLORDIAZEPOXIDO DOSAGEM

OUTROS NOMES:

CLORDIAZEPÓXIDO E METABÓLICOS, DOSAGEM
PSICOSEDIN®

INTERPRETAÇÃO

Este exame é útil para o acompanhamento de indivíduos que fazem uso de clordiazepóxido, um benzodiazepínico empregado como pré-anestésico, ansiolítico, hipnótico e antiepilético, assim como no tratamento da abstinência alcoólica. A determinação do nível sérico do medicamento tem o objetivo de verificar se ele se encontra em níveis terapêuticos ou tóxicos.

As concentrações máximas do fármaco são atingidas várias horas após a administração oral e a meia-vida de eliminação é de 6 a 27 horas. Por volta de 96% circulam ligados às proteínas do plasma. O metabolismo, por sua vez, é hepático, com excreção renal, e os metabólitos têm atividade farmacológica. A intoxicação pela substância caracteriza-se por confusão, ataxia, taquicardia, hipertensão e hiper-reflexia.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

Para a realização deste teste, o cliente deve estar com a dosagem estável da medicação há pelo menos dois dias.

O cliente precisa manter, obrigatoriamente, o horário usual de tomar o medicamento e fazer a coleta da amostra até uma hora antes desse momento habitual ou, então, de acordo com o pedido médico.

Caso o medicamento seja usado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser realizada pelo menos 12 horas após ele ter sido tomado.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.