

Preparo do exame

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOX A E B

OUTROS NOMES

Toxina A (enterotóxica) e Toxina B (citotóxica)
Clostrídio difícile Toxina A e B
Teste para colite pseudomembranosa
Anticorpo Monoclonal Toxina A e B

INTERPRETAÇÃO

Clostridium difficile é um bacilo anaeróbico Gram positivo que pode causar colite pseudomembranosa principalmente em pacientes hospitalizados em uso de antibióticos de largo espectro. O exame é indicado para diagnóstico de diarreia por *Clostridium difficile*. A sensibilidade do teste é 50% e a especificidade é de 98%. A detecção da toxina A e B utilizando anticorpo monoclonal permite uma detecção direta e mais rápida em relação aos ensaios ELISA.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Fezes diarréicas ou com consistência amolecida.
Evitar o uso de antiácido, laxantes e de contraste oral no mínimo 3 dias antes da coleta das fezes ou conforme orientação médica.
Defecar em frasco limpo e seco.
Manter as fezes refrigeradas em casa e transportar ao laboratório o mais rápido possível.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.