

Preparo do exame

CÓCLEA AUTOANTICORPOS

OUTROS NOMES:

68-KD, ANTICORPOS
HEAT SHOCK PROTEIN 70 (HSP70)
HSP-70
KDA 70, ANTICORPOS
SURDEZ AUTOIMUNE, ANTICORPOS

INTERPRETAÇÃO

O teste é útil para auxiliar o diagnóstico de portadores de distúrbio imunológico do ouvido interno, que inclui sempre a síndrome da perda de audição neurossensorial. Os anticorpos anti-68kD são mais prevalentes nos pacientes com perda de audição neurossensorial rapidamente progressiva, especialmente naqueles com menos de três meses de doença. As pessoas que apresentam esse anticorpo parecem responder melhor à terapia imunossupressora.

INSTRUÇÕES DE COLETA

Material: Sangue.
Jejum de 4 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.