

## Preparo do exame

### ENTAMOEBA HISTOLYTICA AG

#### OUTROS NOMES:

ADESINA GALACTOSE – ESPECÍFICA  
ENTAMOEBA HYSTOLYTICA E ENTAMOEBA DISPAR, DIFERENCIAÇÃO POR ELISA  
ELISA PARA ENTAMOEBA HISTOLYTICA  
DIFERENCIAÇÃO ENTRE E. HYSTOLYTICA E E. DISPAR

#### INTERPRETAÇÃO

No diagnóstico da amebíase existe dificuldade do achado da E histolytica pelos métodos parasitológicos devido à fragilidade das formas trofozoíticas e císticas deste parasita. A detecção de seus antígenos específicos em extratos aquosos de amostras de fezes apresenta maior sensibilidade diagnóstica. Indicações: Para diagnóstico de amebíase, na persistência dos sintomas clínicos após o resultado negativo do exame parasitológico. Interpretação clínica: No exame microscópico das fezes as duas espécies de Entamoeba histolytica e E. díspar são morfologicamente idênticas. O teste imunoenzimático para a pesquisa do antígeno de E histolytica (patogênica) faz a discriminação das espécies.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Fezes.  
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.  
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirainha do convênio, RG ou CPF ou CNH.  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).  
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.