

Preparo do exame

ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPOS IgG

OUTROS NOMES:

AMEBÍASE IGG
AMEBÍASE
AMEBA

INTERPRETAÇÃO

A Entamoeba histolytica é uma ameba intestinal que parasita o colo e que causa infecção após a ingestão de seus cistos. Cerca de 12% da população mundial é infectada com a Entamoeba histolytica. Estima-se que 90% dos indivíduos infectados não apresentam sintomas. Os 10% de indivíduos infectados sintomáticos apresentam desde sintomatologia inespecífica, até sintomas gastrintestinais específicos como disenteria, colite e ameboma, com progressão para invasão extra-intestinal entre 2 e 20% dos casos. A detecção microscópica do parasita, após métodos de concentração e coloração especiais, apresenta baixa sensibilidade. A sorologia possui maior sensibilidade para as formas extra-intestinais, sensibilidade moderada para doença intestinal invasiva e baixa sensibilidade para formas assintomáticas. O teste é útil na distinção entre abscessos hepáticos amebianos e piogênicos, entretanto, a alta incidência de amebíase em nosso meio diminui o poder discriminatório do teste. Falso-positivos podem ocorrer em pacientes com colite ulcerativa. Títulos de anticorpos podem ser detectáveis por mais de 6 meses após tratamento eficaz.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.