

Preparo do exame

ERITROVIRUS B19 IGG E IGM

OUTROS NOMES

ERITEMA INFECCIOSO, ANTI PARVOVIRUS
PARVOVIRUS B19 IGG E IGM, ANTICORPOS ANTI
PARVOVIRUS B19, ANTICORPOS ANTI
PARVOVÍRUS B19, ANTICORPOS IGG E IGM
ERITROVÍRUS B19, ANTICORPOS IGG E IGM
QUINTA MOLÉSTIA EXANTEMÁTICA
SOROLOGIA PARA PARVOVÍRUS B19
SOROLOGIA PARA ERITROVÍRUS B19

INTERPRETAÇÃO

O eritrovírus B19, como se denomina atualmente o parvovírus B19, é um vírus de cadeia simples e pequena de DNA que costuma ser associado ao eritema infeccioso (quinta moléstia exantemática), comum em crianças. O agente ainda é capaz de causar crise aplástica em portadores de anemia hemolítica. Muitos indivíduos apresentam quadro importante de dores articulares. Em gestantes, a infecção pode ocasionar perda fetal. Este exame ajuda a diagnosticar a infecção e também determina a imunidade ao eritrovírus B19.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.