

Preparo do exame

ERITROVÍRUS B19 POR PCR VÁRIOS MATERIAIS

OUTROS NOMES

PARVOVÍRUS B19, DETECÇÃO POR BIOLOGIA MOLECULAR
DETECÇÃO DE PARVOVÍRUS B19, POR PCR QUALITATIVO
DETECÇÃO MOLECULAR DE PARVOVÍRUS B19
PCR QUALITATIVO PARA PARVOVÍRUS B19

INTERPRETAÇÃO

O exame serve para o diagnóstico de infecção aguda pelo eritrovírus, sobretudo quando a sorologia se mostra inconclusiva. Tem particular utilidade em pacientes imunocomprometidos, assim como em gestantes que apresentaram o quadro agudo da virose, nas quais a pesquisa deve ser idealmente realizada no líquido amniótico.

O DNA do eritrovírus é comumente detectado já na primeira fase da doença, que se caracteriza, em imunocompetentes, por rash, prurido, cefaleia, mialgia e calafrios.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Este exame pode ser realizado em sangue, líquido e líquido amniótico.

A coleta para o líquido e líquido amniótico é realizada pelo médico solicitante.

Jejum de 4 horas para a coleta de sangue.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.