

## Preparo do exame

### ESPOROTRICOSE

#### OUTROS NOMES:

ANTICORPO CONTRA SPOROTHRIX SCHENCKII

#### INTERPRETAÇÃO

Exame geralmente utilizado no diagnóstico de lesões extracutâneas, incluindo aquelas com acometimento articular, com suspeita de esporotricose no diagnóstico diferencial. Quando existe somente acometimento cutâneo a sorologia pode ser negativa. Indicação: Diagnóstico da esporotricose. Interpretação clínica: A sorologia torna-se reagente 90 a 95% das infecções primárias, geralmente duas semanas após a infecção e negativa dentro dos sete meses seguintes.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.