

Preparo do exame

ETHOSUXIMIDA

OUTROS NOMES:

ETOSSUXIMIDA, PESQUISA E DOSAGEM NO SANGUE
ZARONTIN®, DOSAGEM NO SANGUE

INTERPRETAÇÃO

A etossuximida (Zarontin®) é utilizada para o tratamento de epilepsia com crises de ausência. Os efeitos tóxicos ocorrem com níveis séricos acima de 100 microgramas/mL e se assemelham aos da intoxicação por barbitúricos, ou seja, depressão do sistema nervoso central com depressão respiratória, náusea e vômito.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

Para a realização deste teste, o cliente deve estar com a dosagem estável da medicação há pelo menos 15 dias.

O indivíduo precisa manter, obrigatoriamente, o horário usual de tomar o medicamento e fazer a coleta da amostra até uma hora antes desse momento habitual ou, então, de acordo com o pedido médico.

Caso o medicamento seja usado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser realizada pelo menos 12 horas após ele ter sido tomado.

Em suspeitas de intoxicação, o exame pode ser feito a qualquer momento - deve-se, porém, anotar o horário da última dose.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.