

Preparo do exame

FATOR II ATIVIDADE PLASMA

OUTROS NOMES

ATIVIDADE FATOR 2
ATIVIDADE FATOR II
DEFICIENCIA DO FATOR 2
DEFICIENCIA DO FATOR II
DOSAGEM DO FATOR II
DOSAGEM FATOR 2
QUANTIFICAÇÃO FATOR II

INTERPRETAÇÃO

O teste é utilizado para o diagnóstico das deficiências congênicas e adquirida de fator II (protrombina) e para a investigação de tempo de protrombina e/ ou tempo de tromboplastina parcial ativada prolongado.

A deficiência congênita de protrombina é rara e apresenta herança autossômica recessiva. Já as principais causas da deficiência adquirida incluem insuficiência hepática, anticorpos contra o fator II, deficiência de vitamina K e anticoagulação oral.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias especialmente anticoagulante oral e heparina.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.