

Preparo do exame

FATOR VIII ATIVIDADE PLASMA

OUTROS NOMES:

AHF

FAH

FATOR ANTI-HEMOFILICO

FVIII-FUNCIONAL

TESTE PARA HEMOFILIA A

FATOR ANTI HEMOFILIA

FATOR 8 ATIVIDADE

INTERPRETAÇÃO

Este teste é utilizado no diagnóstico das deficiências congênitas e adquiridas de fator VIII e na investigação de TTPA prolongado.

A deficiência de fator VIII de causa congênita decorre de hemofilia A, doença de Von Willebrand e deficiências combinadas (raras). Já a deficiência de fator VIII de causa adquirida pode ser proveniente de doenças neoplásicas (por consumo ou presença de anticorpos contra o fator VIII), doenças auto-imunes (presença de anticorpos contra o fator VIII) e coagulação intravascular disseminada (por consumo).

Níveis elevados de fator VIII (acima do percentil 90 para a população) são considerados um fator de risco para trombose arterial e venosa. Além dos aspectos genéticos, algumas situações clínicas determinam a elevação do fator VIII, a exemplo de doença hepática, gestação, uso de estrógenos e doenças inflamatórias.

A dosagem do fator VIII também é empregada no controle de qualidade de concentrados de fator VIII (liofilizado e crioprecipitado) produzidos em hemocentros.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias, principalmente anticoagulante oral e heparina.

Nas três horas que antecedem a coleta de sangue, o cliente não deve fazer exercícios físicos.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.