

## Preparo do exame

### FENCICLIDINA

#### OUTROS NOMES:

PCP; PENICICLIDINA

#### INTERPRETAÇÃO

Droga desenvolvida como anestésico e que provoca sintomas dissociativos, antagonista não-competitivo e dose dependente do receptor NMDA. O antagonismo é dose-dependente. Quando fumada tem pico de efeito é em 15 minutos e quando ingerido o nível mais elevado no sangue é em torno de 1,5 a 2 horas. Indicações: Detecção do uso de fenciclidina  
Interpretação clínica: O uso da substância em quantidade considerável é detectado na urina. A detecção depende de fatores como peso, uso ocasional ou crônico, dose utilizada, condições físicas, idade, alimentação, quantidade de líquido ingerido e diurese.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Urina.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.