

Preparo do exame

FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA

OUTROS NOMES:

FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA
FOSFATASE ACIDA TARTARATO, SENSÍVEL
PROSTÁTICA, FOSFATASE.

INTERPRETAÇÃO

A fração prostática é secretada unicamente pelo epitélio da próstata e a sua atividade é inibida pelo ácido tártrico. Essa dosagem é inferior ao PSA no diagnóstico e monitorização do tratamento do câncer de próstata. Valores normais podem ser encontrados no câncer de próstata inicial e seu valor preditivo positivo no diagnóstico dessa neoplasia e inferior a 5%. Elevações também podem decorrer da manipulação prostática, interferências de outras fosfatases no ensaio, prostatite e outras neoplasias.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 8:00 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

IMPORTANTE

Se a resposta for "SIM" a qualquer uma das perguntas abaixo, recomenda-se aguardar os prazos citados para a coleta do material, em caso de dúvida o cliente devera consultar o médico:

- . Após Toque Retal, aguardar 2 dias;
- . Após ejaculação (Relação Sexual), aguardar 48 horas;

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.