

Preparo do exame

GLIADINA IGA

OUTROS NOMES:

ANTI-GLUTEN
DOENÇA CELIACA
GLIADINA DEAMINADA

INTERPRETAÇÃO

Teste útil para diagnóstico e monitorização do tratamento da Doença Celíaca e da Dermatite Herpetiforme. Na Doença Celíaca, a ingestão de glúten leva à produção de anticorpos IgG e IgA anti-gliadina e anticorpos anti-endomísio. Resultado negativo não afasta completamente a Doença Celíaca. Apresentam sensibilidade e especificidade inferior ao anti-endomísio. A detecção de anti-gliadina IgG é importante, pois 10% dos pacientes portadores de Doença Celíaca tem deficiência congênita de IgA. Anti-gliadina IgA está presente em 75 a 90% dos casos de Doença Celíaca. Anti-gliadina IgG está presente em 69 a 85% dos pacientes com Doença Celíaca e 29% de indivíduos sem a doença. A dosagem de anti-gliadina IgM não agrega poder diagnóstico. Redução dos títulos de gliadina ocorrem em meses após o início da restrição dietética. O padrão ouro para diagnóstico de Doença Celíaca é a biopsia intestinal.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.
Jejum de 8:00 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.