

Preparo do exame

HERPES VIRUS 1 E 2 IGG IGM LIQUOR

OUTROS NOMES:

HERPES SIMPLEX I/II, ANTICORPOS IGG E IGM NO LCR, QUANTITATIVO IGG E IGM PARA HERPES VÍRUS 1 E 2 NO LÍQUOR

INTERPRETAÇÃO

O teste é útil para o diagnóstico da infecção herpética, que pode ser causada tanto pelo herpesvírus tipo 1 (HSV-1) como pelo herpesvírus tipo 2 (HSV-2), incluindo a pesquisa específica de anticorpos da classe IgG dirigidos contra o HSV-1 e contra o HSV-2. O exame também investiga anticorpos IgM contra o HSV, porém sem fazer distinção entre os tipos de vírus, devido à extensa reatividade cruzada entre eles.

Os resultados devem ser analisados como um todo, ou seja, características gerais do líquido cefalorraquidiano (LCR) e achados da tomografia e da ressonância devem ser bem valorizados. O quadro clínico do indivíduo igualmente é muito importante. O fato é que a positividade da reação pode refletir apenas o estado imunológico do paciente, que, assim, apresenta anticorpos séricos que apenas passaram para o LCR. Por essa razão, o tempo de instalação dos sinais clínicos também precisa ser levado em consideração.

O ideal é fazer concomitantemente as determinações de anticorpos e albumina no soro e no líquor para estabelecer a origem dos anticorpos achados no líquor.

INSTRUÇÃO DE COLETA

As amostras precisam ser colhidas em frasco estéril, devendo ser mantidas refrigeradas. Colher mínimo de 1mL de líquor.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.