

Preparo do exame

HISTOPLASMA, ANTÍGENO

OUTROS NOMES

ANTÍGENO URINÁRIO DE HISTOPLASMA

INTERPRETAÇÃO

O *Histoplasma capsulatum* é um fungo dimórfico endêmico no Brasil e nos Estados Unidos. A infecção ocorre por meio da inalação de microconídios, podendo ou não causar doença sintomática subsequente. A grande maioria (90%) dos indivíduos infectados permanecem assintomáticos; os casos sintomáticos variam entre uma pneumopatia auto-limitada até doença grave e disseminada, dependendo da carga fúngica inalada e do status imunológico do indivíduo. Pacientes com maior risco de doença grave incluem aqueles com disfunção de imunidade celular, como infectados por HIV, receptores de transplante de órgão sólido e portadores de doenças onco-hematológicas. A detecção do antígeno de *Histoplasma* na urina tem sensibilidade de 80% a 95% para doença ativa, que é mais alta em relação à cultura e à sorologia quando se trata de doença localizada. Ademais, pode ser utilizada durante o seguimento para avaliação da resposta terapêutica, uma vez que os níveis de antígenos tendem a cair, embora possa persistir a positividade do teste em níveis baixos após a conclusão do tratamento.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Urina Lavar as mãos e genitália antes da coleta.

Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio.

Colher o jato médio da urina com retenção de 4 horas entre as micções.

Volume mínimo de 10 mL

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.