

Preparo do exame

HIV GENOTIPAGEM

INTERPRETAÇÃO

Os inibidores de integrase são medicamentos antirretrovirais que inviabilizam a ação desta enzima do HIV, responsável pela integração do DNA proviral ao genoma da célula hospedeira, etapa crucial do ciclo replicativo do vírus. As drogas disponíveis nessa classe são o raltegravir, o elvitegravir e o dolutegravir. A emergência de mutações de resistência foi observada in vitro em pacientes que apresentaram falha virológica durante o uso dessas drogas. Este teste consiste na amplificação seguida de sequenciamento do gene Pol do HIV, região codificadora da integrase, a fim de detectar e reportar mutações em posições associadas à resistência aos inibidores de integrase.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

Este exame NÃO contempla as mutações referentes à sensibilidade do HIV a inibidores de transcriptase reversa ou de polimerase, que devem ser solicitadas à parte.

Não é possível realizar o exame para pessoas cuja carga viral esteja indetectável. O resultado pode ser inconclusivo para cargas virais inferiores a 2000 cp/mL.

Informar data e resultado da última carga viral do cliente (se disponível).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.