

Preparo do exame

HPV DETECÇÃO E GENOTIPAGEM DE ALTO RISCO

OUTROS NOMES

HPV DETECÇÃO E GENOTIPAGEM DE ALTO RISCO (QUALITATIVO)

GENOTIPAGEM DO HPV 16 E 18

INTERPRETAÇÃO

HPV tipo 16 e HPV tipo 18 são responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer cervical e estão, significativamente, associados a um maior risco de progressão da doença, em comparação com outros genótipos de HPV de alto risco. A distinção do HPV 16 e HPV 18 de outros tipos oncogênicos de HPV é importante para identificar as mulheres com maior risco de neoplasia intra-epitelial cervical nível 3 e permitir uma abordagem menos agressiva de mulheres com outras infecções por HPV oncogênicos. Para prevenir a progressão da doença, o HPV deve ser detectado e tratado precocemente. Conseqüentemente, o teste de DNA para HPV é estabelecido na maioria dos países europeus para rastreamento do câncer de colo uterino e, atualmente, é recomendado para o acompanhamento de lesões, após a terapia ou como adjuvante para aumentar a sensibilidade da citologia para as mulheres com idade superior a 30 anos. A detecção dos 14 genótipos de HPV de alto risco e a genotipagem do HPV 16 e HPV 18 permitem melhor avaliação de risco e tratamento do paciente. Este teste fornece as informações necessárias para a estratificação ideal do paciente; consolidando as ferramentas diagnósticas de seleção e genotipagem em uma única reação, portanto muito mais custo-efetiva.

INSTRUÇÕES DE COLETA

Material:

Raspado de leões ou raspado de região considerada suspeita.

Mínimo de 08 horas sem higiene local para coleta peniana, anal ou genitália externa feminina.

Coleta uretral: colher preferencialmente pela manhã sem urinar, ou com retenção urinária de 4 horas.

Não estar menstruada. Aguardar 48 horas após o término da menstruação para realizar a coleta.

Nas 72 horas que antecedem a coleta:

- Não fazer exame digital (toque) ou assepsia endovaginal;
- Manter abstinência sexual;
- Não usar creme/óvulo vaginal, ducha ou lavagem interna (endovaginal);
- Não fazer ultrassom transvaginal ou colposcopia;
- Não fazer peniscopia

É recomendável aguardar 6 meses após cauterização ou tratamento para testar a eficácia do tratamento. Verificar sempre a orientação médica quanto ao tempo de espera e seguir essa orientação.

Não realizamos a coleta do material de biópsia, pois se trata de um procedimento médico.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.