

## Preparo do Exame

### IGE PENICILINA V (C2)

### OUTROS NOMES

IGE ESPECÍFICO (C2) - DROGAS - PENICILINA V

### INTERPRETAÇÃO

A interpretação de IgE específica deve ser associada a anamnese e outros exames complementares do paciente. A presença de IgE detectável não indica, necessariamente, doença alérgica, tampouco sua ausência a exclui.

Pode observar um resultado negativo em pacientes que são hipersensíveis a drogas, nas seguintes circunstâncias:

A amostra foi colhida menos de 2 semanas depois da reação alérgica. O teste deve ser repetido passadas 2 semanas para confirmar o resultado.

A amostra foi colhida passada um longo período temporal após ter ocorrido a última reação alérgica. Têm se verificado que a concentração do anticorpo IgE diminui ao longo do tempo.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.