

Preparo do exame

IGFBP-1 PROTEÍNA LIGADORA

INTERPRETAÇÃO

Existem seis tipos de proteínas descritas que se ligam aos fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs), dentre as quais a principal, no plasma, é a IGFBP-3. Já a IGFBP-1 pode ser produzida no fígado e no endométrio, encontrando-se em alta concentração na decídua e no líquido amniótico. Sabe-se que a insulina é uma potente inibidora da síntese de IGFBP-1. A proteína IGFBP-1 parece regular mais as alterações agudas das concentrações de IGFs, diminuindo com o jejum e aumentando após as refeições, além de exercer importante função no transporte dos IGFs do intra para o extravascular. Na forma fosforilada, a IGFBP-1 atua como inibidora dos IGFs e, na forma não-fosforilada, pode potencializar os efeitos do IGF-I.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 8 horas

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.