

Preparo do exame

IMUNOGLOBINA A SECRETORA SALIVA

OUTROS NOMES:

IgA quantitativa

INTERPRETAÇÃO

A IgA secretora é encontrada na lágrima, suor, saliva, leite, colostro e em secreções brônquicas e gastrointestinais. Nessas predomina a subclasse IgA2. Sinônimos: IgA secretora Indicações: Utilizada para a avaliação da IgA secretória, composta principalmente por IgA2, responsável pela imunidade das mucosas. Às vezes é solicitada como auxílio diagnóstico em pacientes com infecções de repetição principalmente no trato respiratório e gastrointestinal. Interpretação clínica: Normalmente existe correlação entre IgA secretória e sérica, mas pacientes podem ter níveis baixos de ambas e serem assintomáticos.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Saliva

Jejum de 4:00 horas.

Para crianças, ficam estabelecidos os seguintes intervalos de jejum:

- Menores de 1 ano: Intervalo entre as mamadas (jejum de 3 horas)
- Crianças de 1 a 4 anos: 6 horas de jejum
- Crianças a partir de 5 anos: Igual critério para adultos(4 a 8 horas).

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

Não escovar os dentes 3 h antes da coleta, não realizar tratamento dentário nas últimas 24h.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.