

Preparo do exame

ÍNDICE DE IGG SORO + LÍQUOR

OUTROS NOMES

IMUNOGLOBULINAS IGG (SORO E LÍQUOR)
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS (SORO E LÍQUOR)

INTERPRETAÇÃO

Aumento da síntese intratecal de IgG é refletida no aumento da razão líquido/soro de IgG. Aumento da razão também pode ser determinado por aumento da passagem de IgG plasmático por quebra da barreira hemato encefálica. A imunoglobulina derivada dessa passagem é corrigida dividindo a razão líquido/soro de IgG pelo índice líquido/soro de albumina, o que fornece o índice de IgG. O índice de IgG apresenta limite superior da normalidade de 0,8. Sua sensibilidade é 90% no diagnóstico de esclerose múltipla. Em suma, índice de IgG elevado e a presença de bandas oligoclonais são achados complementares úteis no diagnóstico de esclerose múltipla, mas o valor preditivo positivo desse teste é dependente do grau de suspeita clínica.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue e Líquor.
O líquido deve ser coletado pelo médico solicitante.
Jejum de 4 horas.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clcando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.