

Preparo do exame

INIBIDOR DO ATIVADOR TISSULAR DO PLASMINOGÊNIO

OUTROS NOMES:

FATOR DO PAI-1

OUTROS NOMES:

O Inibidor do Ativador do Plasminogênio tipo 1, também chamado de PAI-1, é o principal inibidor fisiológico do ativador tecidual do plasminogênio (tPA). Sua função é impedir a ação do tPA que consequentemente inibe a clivagem do plasminogênio em plasmina, e resulta na falha do processo de fibrinólise. Desta forma, pacientes com níveis elevados de PAI-1, apresentam deficiência de plasminogênio, e por isto, estão mais suscetíveis à trombose.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 8 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clcando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.