

Preparo do exame

LACOSAMIDA

INTERPRETAÇÃO

Esta dosagem é útil na monitorização da terapêutica com lacosamida. A lacosamida é uma droga anticonvulsivante aprovada como terapia adjuvante no tratamento de pacientes epilépticos maiores de 17 anos. Trata-se de uma droga com meia-vida de eliminação de cerca de 13 horas. Após a administração oral, a concentração plasmática de lacosamida inalterada aumenta rapidamente e alcança a Cmax em 0,5 a 4 horas após a dose. A droga é primariamente eliminada da circulação sistêmica por excreção renal e biotransformação. Cerca de 95% da dose é excretada na urina como fármaco e metabólitos. Em estudos clínicos, os efeitos adversos mais comumente observados foram sedação, cefaleia, náusea e visão dupla. A correlação entre as concentrações plasmáticas de lacosamida e sua eficácia ou efeitos adversos não é bem estabelecida.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.