

Preparo do exame

LEPTOSPIRA

OUTROS NOMES:

PESQUISA DE ESPIROQUETIDEOS; PESQUISA DE LEPTOSPIRA; PESQUISA DE LEPTOSPIROSE;
PESQUISA DE DOENÇA DE WEIL

INTERPRETAÇÃO

Este exame é indicado para diagnosticar a leptospirose, porém apresenta baixa sensibilidade, razão pela qual se recomenda o exame sorológico para o diagnóstico definitivo. A pesquisa direta da leptospira em sangue é possível durante a primeira semana de doença. Na urina, as leptospirosas geralmente estão presentes após a primeira semana de infecção, quando já desapareceram do sangue, e existe a possibilidade de que continuem a ser excretadas por um período de 2 a 3 meses. Apesar disso, a concentração de leptospirosas na urina é baixa e sua eliminação pode ser intermitente. A cultura de sangue ou de urina para o isolamento desse agente apresenta maior sensibilidade.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Urina

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.