

Preparo do exame

LIPOPROTEÍNA A

OUTROS NOMES:

APOLIPOPROTEINA
APOLIPOPROTEINA A1
DOENÇA DE TANGIER
APO A 1

INTERPRETAÇÃO

É o maior componente protéico do colesterol HDL e o agente responsável pela ativação da lecitina-colesterol-aciltransferase, que catalisa a esterificação do colesterol. Essa esterificação no HDL permite uma maior concentração de colesterol no interior desta lipoproteína e com isso uma maior remoção do colesterol livre dos tecidos extra-hepáticos para o fígado. Embora ainda incerto, existem evidências de que o sítio de síntese da Apo-A seja o fígado, o intestino ou ambos. Também está definido que a elevação do colesterol HDL diminui o risco de doença arterial aterosclerótica (DARC). Ausência das apoproteínas são raras, mas podem ocorrer como na deficiência de ApoA-1, na doença de Tangier, na abetalipoproteinemia ou hipobetalipoproteinemia familiar. Indicação: Útil na avaliação do risco de doença arterial coronariana. Interpretação clínica: Os níveis de ApoA se correlacionam inversamente com o risco de doença arterial coronariana.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.