

Preparo do exame

LISTERIA MONOCYTOGENES

OUTROS NOMES:

LISTERIA MONOCITOGENES
LISTERIA MONOCYTOGENES, ANTICORPOS TOTAIS
LISTERIA MONOCYTOGENES, SOROLOGIA
LISTERIOSE
LISTERIOSE, SOROLOGIA PARA

INTERPRETAÇÃO

A listeriose é uma infecção causada por um bacilo gram-positivo, a *Listeria monocytogenes*, que, quando acomete uma gestante, pode provocar um abortamento, entre outras manifestações clínicas. Os resultados das sorologias precisam ser interpretados com cautela, pois reações cruzadas são freqüentes em decorrência de determinantes antigênicos comuns entre a *L. monocytogenes* e bactérias gram-positivas. Assim, o resultado de uma única amostra nem sempre é conclusivo, devendo-se invariavelmente proceder à análise de dois testes, feitos com intervalo de dez dias entre eles. Uma ascensão de quatro vezes no título sugere infecção recente. O exame mais recomendado para a confirmação diagnóstica é a cultura de material vaginal colhido imediatamente após o abortamento.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.
Jejum de 4 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.