

Preparo do exame

PEPTÍDEO C PÓS PRANDIAL

INTERPRETAÇÃO

O peptídeo C é utilizado para avaliar a produção de insulina pelo corpo (endógena), diferenciando-a da insulina injetada como medicamento (exógena), que não gera peptídeo C. Níveis altos de peptídeo C são encontrados na diabetes tipo 2, insulinomas, hipocalcemia, gravidez, síndrome de Cushing e insuficiência renal. Níveis baixos estão associados à baixa produção de insulina. Isso pode ser observado na diabetes tipo 1 e insulino terapia.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de duas horas após a refeição ou conforme orientação do médico.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.