

## Preparo do exame

### PLAQUETAS ANTICORPOS (IGG E IGM)

#### INTERPRETAÇÃO

IgG está presente em plaquetas de indivíduos não-trombocitopênicos normais e, além disso, IgG ligada à plaquetas não necessariamente é patogênica, podendo refletir ligação de imunocomplexo, ligação de IgG inespecífica ou até realmente um anticorpo anti-plaquetário com potencial para destruir as plaquetas. Alguns medicamentos podem desencadear este processo, como quinidina, alguns hipoglicemiantes orais, sais de ouro; rifampicina; trimetoprim-sulfametoxazol; ácido valproico; fenitoina; novobiocina A; aminossalicilato; metildopa; digitoxina; sulfonamidas; heparina. Indicação: Diagnóstico diferencial entre trombocitopenia de origem imune e não imune. Interpretação clínica: Negativo: anticorpos anti - plaquetas IgG ou IgM normais (indicação de que nenhum mecanismo imune está envolvido na trombocitopenia); Fracamente positivo: elevações moderadas de anticorpos anti - plaquetas IgG ou IgM (sugere que mecanismos imunes podem estar envolvidos na trombocitopenia); Positivo: elevados níveis de anticorpos anti - plaquetas IgG e IgM (mecanismos imunes estão envolvidos na trombocitopenia).

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirainha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.