

Preparo do exame

PM/SCL ANTICORPOS

OUTROS NOMES:

ANTI-PM1, PESQUISA DE ANTICORPOS
ANTIBODY TO PM1
ANTICORPO ASSOCIADO A POLIMIOSITE
ANTICORPOS ANTI-PM1, PESQUISA DE
Anticorpos PM SCL
PM - SCL
PM/SCL, Anticorpos
PM/Scl, Anticorpos totais no soro
PM1, ANTI

INTERPRETAÇÃO

Exame útil no diagnóstico de doenças reumáticas auto-imunes. Anticorpos anti-PM/Scl são considerados marcadores sorológicos da síndrome de sobreposição polimiosite / esclerose sistêmica, sendo detectados em aproximadamente 50 a 70% desses pacientes. Estes auto-anticorpos não flutuam durante o curso da doença e apontam para um bom prognóstico. Podem ser detectados em menor frequência em outros quadros clínicos como miosite idiopática (20%) e esclerose sistêmica (10%).

A pesquisa é realizada pela técnica de imunodifusão dupla de Ouchterlony e conta com uma fração específica de extrato de baço de vitela como fonte antigênica.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.