

Preparo do exame

PNEUMOCYSTIS CARINII DETECÇÃO ESCARRO

OUTROS NOMES

DETECÇÃO DE PNEUMOCYSTIS JIROVECI

INTERPRETAÇÃO

A detecção do genoma de *Pneumocystis jirovecii* indica a presença deste fungo no espécime clínico investigado, entretanto os resultados do teste devem ser usados em conjunto com dados clínicos e outros exames radiológicos. É uma infecção oportunista em imunocomprometidos, sobretudo naqueles com AIDS, ocorrendo frequentemente em pacientes com contagem de linfócitos CD4+ inferior a 200 células/mm³. Dispnéia, tosse e febre por dias a semanas são os achados comuns da forma de apresentação pulmonar da pneumocistose. A insuficiência respiratória aguda com necessidade de suporte ventilatório ocorre em cerca de 20% dos casos. O quadro radiológico é heterogêneo, usualmente com infiltrado intersticial bilateral.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Escarro.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.