

Preparo do exame

SCL-70 ANTICORPOS

OUTROS NOMES

ANTI-TOPOISOMERASE

INTERPRETAÇÃO

Nas doenças autoimunes reumatóides podem ser encontrados vários perfis dos autoanticorpos para estes antígenos. Em uma alta incidência, eles estão relacionados à Lupus eritromatóide sistêmico ativo e inativo, doença do tecido conjuntivo misto (Síndrome de Sharp), artrites reumatóides, Síndrome Sjögren, escleroderma, dermatite fotosensitiva e Lupus induzido por drogas.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.