

Preparo do exame

TEMPO DE PROTROMBINA PLASMA

OUTROS NOMES:

COAGULACAO EXTRINSECA,
ANTICOAGULACAO ORAL COAGULACAO EXTRINSECA,
CONTROLE DE ANTICOAGULANTE INR KAOLIM,
TESTE DO TAP.

INTERPRETAÇÃO

O TAP (Tempo de Protrombina) mede a via extrínseca da coagulação, prolongando-se nas deficiências seletivas ou conjuntas dos fatores II, V, VIII e X. Como os quatro fatores são sintetizados no fígado e três dos fatores são vitamina K dependentes (II, VIII e X), o TAP também é utilizado para o monitoramento da terapia de anticoagulantes orais, doenças hepáticas, deficiência de vitamina K, entre outras patologias.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias, principalmente anticoagulantes orais.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.