

Preparo do exame

TESTE DE MISTURA PARA TTPA PROLONGADO PLASMA

OUTROS NOMES

ENSAIO DE MISTURA, PESQUISA DE INIBIDOR DA COAGULAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

Quando o TTPA torna-se elevado na ausência de tratamento com heparina e a contagem de plaquetas se mostra normal, é importante realizar estudos mistos do plasma do paciente com plasma normal para determinar se o tempo de coagulação normaliza (ou seja, se existe deficiência de algum fator). Quando os estudos mistos não corrigem adequadamente os tempos prolongados de coagulação pode-se suspeitar da presença de inibidores da coagulação, como anticoagulante lúpico circulante ou inibidores de fatores.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.