

## Preparo do exame

### TIROGLOBULINA ANTICORPOS

#### OUTROS NOMES

ANTICORPO ANTI-TIREOIDIANO  
ANTI-TIREOGLOBULINA  
ANTICORPO ANTI-TIREOIDE  
ANTI-TIREOGLOBULINA  
AAT  
ATG  
ATGB

#### INTERPRETAÇÃO

Imunoglobulinas circulantes dirigidas contra a tireoglobulina estão presentes em pacientes com tireoidite de Hashimoto e em uma menor extensão, doença de Graves. Os novos métodos praticados em nosso laboratório são mais sensíveis. Anticorpos anti-Tg podem ser detectados em indivíduos sem doença tireodiana clinicamente significativa. Eles não definem o status da função tireoidiana. Anticorpos anti-Tg interferem com a mensuração da tireoglobulina com os imunoensaios. Conseqüentemente, o soro a ser estudado para tireoglobulina é rastreado para a presença de anticorpos antitireoglobulina. Valores obtidos de ensaios diferentes não são comparáveis, sendo, portanto necessário reavaliação dos resultados de métodos diferentes.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.  
Jejum de 4 horas.  
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.  
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.  
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).  
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.