

## Preparo do exame

### TIROPEROXIDASE ANTICORPOS

#### OUTROS NOMES

IGG1, IGG2, IGG3 E IGG4  
ANTICORPO ANTI-TIREOIDIANO, ANTI-TPO  
ANTICORPO ANTI-TIREOIDE, ANTI-TPO  
ANTI-PEROXIDASE  
TIREOPEROXIDASE  
ANTI MICROSSOMAL  
ANTICORPO ANTI-MICROSSOMAL

#### INTERPRETAÇÃO

A peroxidase tireoidiano (TPO), uma enzima que cataliza as etapas de iodinação e acoplamento da biosíntese do hormônio tireoidiano, e agora conhecida como o principal antígeno microssomal. O principal uso deste exame é a confirmação do diagnóstico de tireoidite autoimune. O anticorpo anti-TPO tem sido utilizado no lugar da determinação do anticorpo antimicrossomal. Anticorpos anti-TPO podem ser detectados em pessoas sem doença tireoidiana significativa. Eles não definem o status funcional tireoidiano do paciente. Substitui com vantagens os anticorpos antimicrossomais.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.  
Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.  
Informar medicamentos em uso e, se mulher, informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional.  
Informar qualquer medicamento que usa ou usou recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer (Triostat, Thevier).

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.  
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.  
Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).  
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.